

109學年度國中版-藥物濫用防制知識解答說明

知識題(國中版, 共20題)

一、是非題

請根據題目描述, 勾選正確或不正確:	正確	不正確
50. 新興 (新型態)毒品效果類似毒品, 但不容易被檢驗出來, 對健康的危害也較低。		V
51. 吸食安非他命的時候, 剛開始會憂鬱和疲勞, 長期使用則會造成精神振奮。		V
52. 人體對非法藥物會產生心理性依賴及生理性依賴, 其中又以心理性依賴最難戒除。	V	
53. 使用非法藥物者大多數先從吸菸、喝酒、嚼食檳榔開始→再使用一、二級毒品 (如海洛因、安非他命等)→然後使用三、四級毒品 (如愷他命 (K他命)、一粒眠等)。		V
54. 有關非法藥物使用相關刑責, 持有、吸食、分享、製造、運輸、販售者均需負相關刑責, 其中又以製造、運輸和販賣者的刑責特別嚴重。	V	
55. 長期吸食安非他命, 會有耐藥性, 但可憑意志力戒除。		V
56. 如果多結交使用非法藥物的朋友, 會增加自己使用非法藥物的機會。	V	
57. 安非他命是屬於中樞神經抑制劑的非法藥物, 會讓人睏倦昏睡。		V
58. 生活如果有目標、對未來有規劃, 比較不會使用非法藥物	V	
59. 使用非法藥物最主要是導致身體消化系統功能的嚴重傷害。		V

二、選擇題

60. 「我認為使用非法藥物有害健康, 有健康概念的人是不會使用非法藥物的。」這句話在拒絕技巧中, 屬於哪一種方式?
- (1) 堅持拒絕法
 - (2) 告知理由法 *
 - (3) 自我解嘲法
 - (4) 遠離現場法。
61. 參加聚會時, 你會採取何種最適切的方法以避免飲料被動手腳?
- (1) 應先詳細注意飲料的來源、小心檢視包裝, 並親自打開。*
 - (2) 有人要請你喝一杯, 欣然接受。
 - (3) 因為要上化妝室, 請朋友幫你看飲料。
 - (4) 聞聞看或嚐嚐看, 如果沒有怪味道, 當可安心飲用。
62. 下列對於拒絕非法藥物的敘述, 何者錯誤?
- (1) 拒絕非法藥物的最基本方法就是要摒除不良嗜好、作息正常。
 - (2) 只要自己意志力夠強, 即使成癮也可以輕易戒除。*
 - (3) 以非法藥物來提振精神, 是預支體力, 耗費生命的行為。
 - (4) 非法藥物危害的不只是自身的健康, 同時也傷害生命與尊嚴。

63. 以下有關愷他命 (K他命)的說明, 哪一項是錯誤的?
- (1) 在臺灣已被政府單位列為第三級毒品。
 - (2) 愷他命 (K他命)的外觀為白色、抽K菸會上癮。
 - (3) 愷他命 (K他命)會傷害膀胱, 使膀胱變小。
 - (4) 愷他命 (K他命)的毒性不強, 所以長期使用沒關係。*
64. 下列有關新興 (新型態)毒品的陳述, 哪一項是錯誤的?
- (1) 新興 (新型態)毒品可能以變身方式呈現, 如茶包、巧克力形式等。
 - (2) 新興 (新型態)毒品比傳統非法藥物沒有傷害性。*
 - (3) 新興 (新型態)毒品有很多假毒品或含對身體有害的物質。
 - (4) 買有被重新封口或包裝過的咖啡包, 就有可能買到新興 (新型態)毒品。
65. 小志幫朋友以電話與人接洽販賣非法藥物, 小志的行為是否觸法?
- (1) 只有負責聯絡, 不會構成犯罪。
 - (2) 其行為是屬於販賣非法藥物的一種, 構成了犯罪。*
 - (3) 沒有實際見面的販賣行為, 不會構成犯罪。
 - (4) 因為是義務幫忙, 而且沒有拿錢, 就不構成犯罪。
66. 下列有關藥物濫用導致的影響, 何者錯誤?
- (1) 個人身體器官功能受損
 - (2) 家庭經濟負擔加重
 - (3) 社會治安問題惡化
 - (4) 心理情緒壓力解除 *
67. 以下關於非法藥物搖頭丸的敘述, 何者錯誤?
- (1) 在臺灣已被政府單位列為第2級毒品。
 - (2) 搖頭丸的外觀常為藥片或膠囊形狀。
 - (3) 長期使用搖頭丸會上癮, 但對腦部神經不會造成損傷。*
 - (4) 搖頭丸會造成人體食慾不振、牙關緊閉、噁心、肌肉痛、流汗、心悸, 並具迷幻作用。
68. 當發現親人出現濫用非法藥物的行為時, 下列何者是幫助他們脫離毒癮的方法?
- (1) 盡可能陪在他們身邊, 鼓勵他們不要再用非法藥物。
 - (2) 應視吸毒者為生病的人, 要尋求協助。
 - (3) 若已成癮, 鼓勵他們尋求治療。
 - (4) 以上皆是。*
69. 依據法令規定, 下列有關非法藥物相關犯罪行為的敘述, 何者錯誤?
- (1) 吸食或施打非法藥物都是犯罪行為
 - (2) 持有但是並未使用非法藥物並不犯法。*
 - (3) 運輸、製造、販賣非法藥物最高可以處以死刑
 - (4) 分享、提供非法藥物者是違法的

●解答說明

一、是非題

請根據題目請勾選描述，勾選答案選項：	正確	不正確
49. 新興(新型態)毒品效果類似毒品，但不容易被檢驗出來，對健康的危害也較低。		V
答案提示：不正確。 為保護少年、學生遠離毒害，防制毒品犯罪年輕化，全台警力不遺餘力，厲行查緝。除了毒品辨識、尿液檢驗外，還運用各項科學儀器讓毒品查緝幾乎無所遁形。		
50. 吸食安非他命的時候，剛開始會憂鬱和疲勞，長期使用則會造成精神振奮。		V
答案提示：不正確。 安非他命為中樞神經興奮劑，初用時有提神、振奮、欣快感、自信、滿足感；長期使用會造成如妄想型精神分裂症之安非他命精神疾病，症狀包括猜忌、多疑、妄想、情緒不穩、易怒、視幻覺、聽幻覺、觸幻覺、強迫或重覆性的行為及睡眠障礙等，也常伴有自殘、暴力攻擊行為		
51. 人體對非法藥物會產生心理性依賴及生理性依賴，其中又以心理性依賴比較難戒除。	V	
答案提示：正確。 (1) 依生理性依賴：是指藥物濫用者停止使用藥物後，產生戒斷症狀，濫用者為抒解不舒服的症狀而持續用藥。 (2) 心理性依賴：是指藥物濫用者明知道重複使用這些藥物，會對身體帶來不良的影響，但又對它們產生強烈需求和欲望。 (3) 戒治療程可分為三階段：生理戒治、心理戒治與追蹤輔導，其中心理戒治最困難，成癮者須有堅定的拒毒信念與熟練的拒毒技巧，才能避免再次接觸成癮藥物。		
52. 使用非法藥物者大多數先從吸菸、喝酒、嚼食檳榔開始→再使用一、二級毒品(如海洛因、安非他命等)→然後使用三、四級毒品(如愷他命(K他命)、一粒眠等)。		V
答案提示：不正確。 在許多毒犯的吸毒經驗中，大多數是從吸菸、喝酒、施用安非他命到海洛因的漸進式發展，這些人為了追求更大的感官刺激，卻因此走上吸毒的不歸路		
53. 有關非法藥物使用相關刑責，持有、吸食、分享、製造、運輸、販售者均需負相關刑責，其中又以製造、運輸和販賣者的刑責特別嚴重。	V	
答案提示：正確。 摘述「毒品危害防制條例」相關規定(以二級毒品為例)如下： *製造、運輸、販賣：處無期徒刑或七年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。 *意圖販賣而持有：處五年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。 *以強暴、脅迫、欺瞞或其他非法之方法使人施用：處無期徒刑或七年以上有期徒刑，得併科新臺幣七百萬元以下罰金。		

*引誘他人施用：處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金。 *轉讓：處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣七十萬元以下罰金。 *成年人對未成年人犯前三條之罪者（以強暴、脅迫、欺瞞或其他非法之方法使人施用、引誘他人施用、轉讓），依各該條項規定加重其刑至二分之一。 *施用：處三年以下有期徒刑。 *持有：處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣三萬元以下罰金。		
54. 長期吸食安非他命，會有耐藥性，但可憑意志力戒除。		V
答案提示：不正確。 許多非法藥物容易使人上癮，長期使用會產生耐藥性及心理、生理依賴性，僅靠意志力而戒除成功的機率很低，因此連一次都不能嘗試。		
55. 如果多結交使用非法藥物的朋友，會增加自己使用非法藥物的機會。	V	
答案提示：正確。		
56. 安非他命是屬於中樞神經抑制劑的非法藥物，會讓人睏倦昏睡。		V
答案提示：不正確。 安非他命Amphetamine，或甲基安非他命Methamphetamine 中樞神經興奮劑的第二級毒品。 (1) 初用時會有提神、振奮、欣快感、自信、滿足感；多次使用後，前述感覺會逐漸縮短或消失，不用時會感覺無力、沮喪、情緒低落而致使用量及頻次日增。 (2) 長期使用會造成如妄想型精神分裂症之安非他命精神疾病，症狀包括猜忌、多疑、妄想、情緒不穩、易怒、視幻覺、聽幻覺、觸幻覺、強迫或重覆性的行為及睡眠障礙等，亦常伴有自殘、暴力攻擊行為等。 (3) 停用之戒斷症狀包括疲倦、沮喪、焦慮、易怒、全身無力，嚴重者甚至出現自殺或暴力攻擊行為。		
57. 生活如果有目標、對未來有規劃，比較不會使用非法藥物。	V	
答案提示：正確。		
58. 使用非法藥物最主要是導致身體消化系統功能的嚴重傷害。		V
答案提示：不正確。 非法藥物會對腦中樞神經造成影響，吸毒者為達到預期的效果，往往需要反覆增加使用量，在不知不覺的情況下過量使用，造成中毒現象，依賴非法藥物。一旦終止或減少使用非法藥物，身體會產生流淚、打哈欠、嘔吐、腹痛、痙攣、焦躁不安及強烈渴求藥物等戒斷症狀。吸毒成癮者在持續使用非法藥物的情況下，極難戒絕，終其一生難以擺脫非法藥物的束縛。除了影響個人健康外，還會面臨失業、求職不易、朋友疏離、婚姻破裂、家庭破碎、自尊受創，而無法適應社會，甚至不惜以暴力或偷竊等不正當的手段謀財，以設法取得非法藥物，造成嚴重的社會問題。		

2、選擇題

59. 「我認為使用非法藥物有害健康，有健康概念的人是不會使用非法藥物的。」這句話在拒絕技巧中，屬於哪一種方式？

- (1) 堅持拒絕法
- (2) 告知理由法
- (3) 自我解嘲法
- (4) 遠離現場法

答案提示：(2)

- (1) 堅持拒絕法:無論朋友們如何勸說，你始終面帶微笑，語氣堅定的說「不」，且不必作任何解釋，只要堅持自己的決定。
- (2) 告知理由法: 說明自己不採取行為的原因或理由。
- (3) 自我解嘲法: 嘲笑友伴，也拿自己開玩笑，以幽默語氣緩和愉快的氣氛，並沖淡朋友的壓力。

60. 參加聚會時，你會採取何種最適切的方法以防飲料被動手腳？

- (1) 應先詳細注意飲料的來源、小心檢視包裝，並親自打開。*
- (2) 有人要請你喝一杯，欣然接受。
- (3) 因為要上化妝室，請朋友幫你看飲料。
- (4) 聞聞看或嚐嚐看，如果沒有怪味道，當可安心飲用。

答案提示：(1)

有安全顧慮的場所，千萬不要飲用來歷不明的飲料，更不要讓飲料或食物離開視線，避免受害。

61. 下列對於拒絕非法藥物的敘述，何者錯誤？

- (1)拒絕非法藥物的最基本方法就是要摒除不良嗜好、作息正常。
- (2)只要自己意志力夠強，即使成癮也可以輕易戒除。
- (3)以非法藥物來提振精神，是預支體力，耗費生命的行為。
- (4)非法藥物危害的不只是自身的健康，同時也傷害生命與尊嚴。

答案提示：(2)。

預防毒品近身的方法

1.摒除不良嗜好

研究調查發現，許多毒品成癮者從吸菸開始，進而從嘗試施用愷他命(K他命)、安非他命到海洛因漸進發展，因此應培養良好生活習慣，摒拒不良嗜好。

2.不要以身試毒

毒品所造成的心理依賴非常可怕，吸毒犯在監獄服刑三、五年，其生理上的身癮早已戒除，但「心癮」難除，因此千萬不要出自於好奇心，或自認「意志過人」、「絕對不會上癮」而以身試毒。

3.尊重自我、堅決拒毒

毒品所傷害的是自己的健康、生命與尊嚴，尊重自我是對自己的生命負責，千萬不要礙於情面或講求朋友義氣而接受朋友的引誘與慫恿。

4.建立正當的情緒抒解方法

人難免情緒低落、苦悶沮喪需要紓解、宣洩的時候，但應該尋求正當且健康的紓解方法（如聽音樂、看電影、運動、找朋友傾訴等等），如因一時的空虛、鬱悶而施用毒品，將沉淪於毒海中而不能自拔。

5.認識正確用藥觀念

健康的身體、飽滿的精神，必須靠適當的營養、運動與正常生活作息，利用毒品藥物提振精神或治療病痛，是嚴重錯誤的觀念。

6.遠離是非複雜場所

根據統計，販毒者常在網咖、KTV、MTV、舞廳、夜店等場所，引誘或威脅青少年使用毒品，應提醒學生如至相關場所娛樂時應提高警覺性，不隨便接受陌生人的飲料、香菸，以確保自身安全。

62. 以下有關愷他命 (K他命)的說明，哪一項是錯誤的？會讓人上癮。

- (1) 在臺灣已被政府單位列為第3級毒品。
- (2) 愷他命 (K他命)的外觀為白色、抽K菸會上癮。
- (3) 愷他命 (K他命)會傷害膀胱，使膀胱變小。
- (4) 愷他命 (K他命)的毒性不強，所以長期使用沒關係。*

答案提示：(4)

Ketamine(愷他命、K他命)

俗稱K仔、Special K或K，是一種全身性麻醉劑，會使病人產生與現實環境解離的麻醉作用。

使用愷他命較常見之副作用為心搏過速、血壓上升、震顫、肌肉緊張而呈強直性、陣攣性運動等。影響吸食者感覺、協調及判斷力，並可產生幻覺、錯亂、意識模糊、暫發性失憶及身體失去平衡等症狀。

研究顯示濫用愷他命，會罹患慢性間質性膀胱炎，產生頻尿、小便疼痛、血

尿等症狀，嚴重者甚至須進行膀胱重建手術。

63. 下列有關新興 (新型態) 毒品的陳述，哪一項是錯誤的？

- (1) 新興 (新型態) 毒品可能以變身方式呈現，如茶包、巧克力形式等。
- (2) 新興 (新型態) 毒品比傳統非法藥物沒有傷害性。**
- (3) 新興 (新型態) 毒品有很多假毒品或含對身體有害的物質。
- (4) 買有被重新封口或包裝過的咖啡包，就有可能買到新興 (新型態) 毒品。

答案提示：(2)

現今新興毒品常混和多種成分，包括：二級毒品安非他命、神仙水、搖頭丸、毒郵票、三級毒品K他命等，有心人士將其混入小糖果、仙渣梅、餅乾、奶茶包等，若學童不知情，恐會誤觸誤食而恐染上毒癮，未來應更加小心。

64. 小志幫朋友以電話與人接洽販賣非法藥物，小志的行為是否觸法？

- (1) 只有負責聯絡，不會構成犯罪。
- (2) 其行為是屬於販賣非法藥物的一種，構成了犯罪。
- (3) 沒有實際見面的販賣行為，不會構成犯罪。
- (4) 因為是義務幫忙，而且沒有拿錢，就不構成犯罪。**

答案提示：(4)

根據毒品危害防制條例，吸毒、販毒、製造、運輸、施用、持有、轉讓等都是觸犯刑法的行為，必須坐牢，但若在被查獲前自動向有關單位報請勒戒，司法單位將視非法藥物使用者為病人，給予毒癮戒治而不予懲處。

65. 下列有關藥物濫用導致的影響，何者錯誤？鴉片類

- (1) 個人身體器官功能受損
- (2) 家庭經濟負擔加重
- (3) 社會治安問題惡化
- (4) 心理情緒壓力解除**

答案提示：(4)

非法藥物會對腦中樞神經造成影響，吸毒者常常會在不知不覺的情況下成癮，進而依賴非法藥物。一旦終止或減少使用非法藥物，身體即會產生流淚、打哈欠、嘔吐、腹痛、痙攣、焦躁不安及強烈渴求藥物等戒斷症狀。吸毒成癮者在持續使用非法藥物的情況下，極難戒絕，終其一生難以擺脫非法藥物的束縛。

66. 以下關於非法藥物搖頭丸的敘述，何者錯誤？

- (1) 個人身體器官功能受損
- (2) 家庭經濟負擔加重
- (3) 社會治安問題惡化**
- (4) 心理情緒壓力解除

答案提示：(3)

搖頭丸為二級毒品，亞甲雙氧甲基安非他命之簡稱，為安非他命類似物質。俗稱亞當、狂喜、搖頭丸。具有興奮中樞神經以及迷幻作用。會造成食慾不振、牙關緊閉、噁心、肌肉痛、運動失調、流汗、心悸、疲倦及失眠。引起之毒性包括體溫過高、血管疾病、心律不整。致命的毒性包括橫紋肌溶解、散布性血管內凝集及急性腎衰竭。體溫過高為中毒主要特色，可高達攝氏 43 度，由於藥物作用加上脫水及身體奮力而造成的高體溫可致死。長期使用 MDMA 不但會上癮，更會造成腦部神經損傷而產生記憶減退、妄想、幻覺及

精神分裂症等現象。

67. 當發現親人出現濫用非法藥物的行為時，下列何者是幫助他們脫離毒癮的方法？

- (1) 盡可能陪在他們身邊，鼓勵他們不要再用非法藥物。
- (2) 應視吸毒者為生病的人，要尋求協助。
- (3) 若已成癮，鼓勵他們尋求治療。
- (4) 以上皆是。

答案提示：(4)

發現家中有人吸毒時，應採取的行動：

- (1) 不要情緒化，好好與對方談一談，並表示關心，如果沒辦法讓對方體會到真誠的關心，想協助他脫困，就比天還難。
- (2) 也要與(學校/醫院)輔導人員保持密切聯繫，大家一起努力，協助戒毒，才能防止情況惡化。
- (3) 吸毒，是一種成癮性行為，通常必須要有醫療層級的方法介入，應該帶到醫療院所，尋求專業協助，進行有效的戒治。
- (4) 無論是各地方的毒品危害防制中心、醫療院所或宗教團體，都是可以諮詢的對象。

68. 依據法令規定，下列有關非法藥物相關犯罪行為的敘述，何者錯誤？搖頭丸是安非他命類非法藥物。

- (1) 吸食或施打非法藥物都是犯罪行為
- (2) 持有但是並未使用非法藥物並不犯法。
- (3) 運輸、製造、販賣非法藥物最高可以處以死刑
- (4) 分享、提供非法藥物者是違法的

答案提示：(2)

根據毒品危害防制條例，吸毒、販毒、製造、運輸、施用、持有、轉讓等都是觸犯刑法的行為，必須坐牢，但若在被查獲前自動向有關單位報請勒戒，司法單位將視非法藥物使用者為病人，給予毒癮戒治而不予懲處。