

蚊子知多少

被蚊子叮咬後會出現紅紅的腫包，而且很癢，為什麼會這樣呢？真的有所謂的「容易被蚊子叮咬」的體質嗎？


被蚊子叮咬後 為什麼會癢？

母蚊為了產卵必須攝取「蛋白質」，為了獲取這個養分才會吸食動物的血液。

吸血時，母蚊會將分布在嘴巴上、長得像吸管的針刺入動物的皮膚。蚊子的口針比人類的頭髮還細，肉眼看起來似乎只有1根，其實多達6根，收納在宛如劍鞘的嘴部結構裡。



蚊子6根口針所負責的功能



而會引起發癢或腫脹反應的物質，正是蚊子的「唾液」。「唾液」除了含有避免血液凝固的成分以外，還包含了減輕痛感的「麻醉」成分，能在對方毫無察覺的狀態下成功吸血。

可是，這種「唾液」對人類身體而言卻是不必要的物質。為了將這些成分趕出體外所產生的過敏反應，就會導致被叮咬的地方紅腫、發癢。

什麼人容易被蚊子叮咬？

蚊子會被汗水的味道和體溫吸引，而找到下手的目標。

那麼，為什麼有些人容易被叮咬，有些人卻不會呢？目前雖然有各種研究指出「與血型有關」、「與汗水的味道有關」等等，但尚未找出明確的原因。



有些蚊子會 傳播疾病

蚊子所帶原的病毒，有時是導致人類生病的原因。透過蚊子傳染的疾病相當多，比方說在日本就必須特別注意「日本腦炎」。為了避免被傳染，請務必做好防蚊準備。



親自體驗看看！

在家裡內外進行防蚊巡視

蚊子會在有水的地方產卵，大約10天就能長為成蟲。只要有少量的水便會孳生蚊子，所以請在家中內外巡視，檢查看看有沒有蚊子喜歡的積水處。若有，請務必將積水倒掉，並且將容器移至不會被雨水淋到的地方。

此外，公蚊與母蚊平時會吸食植物的蜜露或汁液，草叢既是他們的藏身處，也是覓食的地方，因此庭院必須經常除草。

※巡視時，請穿著長袖長褲，並噴灑防蚊液，會比較安全。

會孳生蚊子的地方

生活中常見的積水處如下，是容易孳生蚊子的地方。

- 水桶、澆水壺
- 長期擺在室外的器材
- 盆栽托盤
- 雨水槽 等等

