

如果我被蜂螫了，
我該…？



離開現場與緊閉窗戶

大部分蜂螫人，皆是感受到領域遭受侵擾。因此需離開現場或緊閉居家窗戶，以達人身安全。

了解狀況

離開現場後，檢視自我的身體狀況，需特別注意是否有心悸、暈眩、呼吸困難、蕁麻疹、嘔吐等狀況，並盡速就醫。

盡速就醫

以最快的速度前往附近之醫院，並告知蜂螫數量及自行判斷之身體狀況。

如果發現蜂巢，
我該…？



保持距離

不管是何種蜂類，在發現時都應該保持約5-10公尺左右的安全距離；若於窗邊，請緊閉窗戶，並保持冷靜。

通報119

在保持安全距離後，致電119通報狀況，告知連絡電話、住址等相關資訊。



靜待廠商電話

在通報後，請持續保持安全距離，並留意來電，委外廠商將會與您聯繫。




捕蜂捉蛇 為民服務



通報流程

捕蜂篇



都會區常見蜂類

獨居蜂

為非群聚生活之蜂種，攻擊性極低，種類繁多，常見的類型有泥壺蜂、土蜂、木蜂等。



▲ 圖為泥壺蜂。



▲ 圖為黃胸泥壺蜂。



▲ 有些獨居蜂會鑽洞繁殖。

蜜蜂

在國內常見之蜜蜂有兩個類群，分別為西方蜂(義大利蜂)及東方蜂(野蜂；中國蜂)，攻擊性極低，每年的3-4月為蜜蜂分蜂的月份，常有游離蜂群聚在電線杆、圍牆、住家等地方。



▲ 圖為西方蜂。



▲ 圖為東方蜂。

長腳蜂

長腳蜂為在都會區中，最常被通報的類群。長腳蜂皆為捕食型蜂類，主要捕捉其他昆蟲為食，對於抑制生活周遭的環境害蟲頗有助益。

長腳蜂具有領域性，若民眾沒注意而進入其巢區時，就可能會被攻擊。



▲ 常築巢於行道樹上。



▲ 圖為淡色長腳蜂。

虎頭蜂

危險度最高，民眾最害怕的類群，其會於每年4-5月開始築巢，在9月時會開始產出蜂王，故會較具攻擊性。



▲ 虎頭蜂巢多為球狀巢。



▲ 黃腰虎頭蜂巢的築巢初期，會有長條狀的入口，待巢體變大後即會脫落。